



Facebook



P.3 確診仍返工
檢疫又「甩漏」

P.15 憧憬內地放水
恒指逼近三萬



lionrockdaily 香港仔

www.lionrockdaily.com

2021.3.4 | 星期四

病翁塞三血管

死亡無關疫苗

專委會：科興可續使用 鼓勵長者接種

一名63歲男子上周五（2月26日）接種科興新冠疫苗後兩日，因呼吸困難入院，最終不治。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨召開緊急會議，檢視死者的初步解剖資料後，一致裁定事件與疫苗無關，強調死者生前患嚴重糖尿病和冠心病，3條心血管中，一條100%閉塞，另外兩條70%至90%閉塞，委員會共同召集人李卓廣直言，即使死者沒有接種疫苗亦一樣有心肌梗塞、肺水腫而死亡的風險。香港的疫苗接種計劃將繼續推行，並鼓勵長者和高危人士接種。北京科興中維回應，已獲知此事，並已與香港有關部門保持聯繫，積極配合香港特區的調查，並期待早日獲得調查結果。

專家委員會昨午舉行緊急會議，跟進有人接種疫苗後死亡一事，委員會共同召集人孔繁毅會後交代委員會決定時指，病理科醫生提供的初步解剖報告顯示，死者患嚴重冠心病，3條血管嚴重閉塞，最差的一條是完全閉塞，另外兩條70%至90%閉塞。委員會成員一致相信事件與接種疫苗無關，估計其死因是冠心病導致急性心肌梗塞及肺水腫，令他出現呼吸衰竭。

李卓廣並指，即使死者沒有接種疫苗亦一樣有因心肌梗塞而死亡的風險。被問及疫苗會否有機會間接令死者本身的病情惡化？李卓廣指外國的資料庫至今未有相關資料，「如果有呢個情況（疫苗間接影響病情）可能係好特別情況，現時無法知。」

死者本身患有高血壓、高血脂、中央肥胖、糖尿病及缺血性心臟病等多種長期病，並有吸煙習慣，李卓廣

透露其糖尿病及高血壓病情控制均不理想，入院時的上下血壓分別達190及130，本身應該在控制慢性疾病後，才適合接種疫苗。

孔繁毅提醒，市民有責任了解自己的身體狀況是否適合接種疫苗，重申患有嚴重疾病及有藥物敏感人士，接種疫苗前要先諮詢家庭醫生意見，並在病情受控後再接種疫苗。對於醫護為死者進行急救時未知他曾接種疫苗，孔繁毅強調不論病人有否接種疫苗，急救程序都一樣，不會因此失救。

無隱瞞事件 內部通報需加強

由於委員會初步已清晰裁定死者是死於冠心病所引致的心肌梗塞，認為事件與接種疫苗沒有關係，孔繁毅指科興疫苗可繼續使用，委員會繼續鼓勵長者及高危人士盡快接種。全面的解

剖報告一、兩周後才出爐，委員會屆時將詳細交代事件。

另外，死者身故後兩天才對外公布，醫管局總行政經理劉家獻昨強調，無隱瞞事件，延誤公布是因內部溝通問題。他解釋死者入院後，雖然曾向醫護表示曾接種疫苗，並記錄在急症室的病歷中，但轉送往內科病房時，醫護漏看接種記錄，故在死者身故後，未有啟動疫苗事故通報機制。院方直至今日再檢視死者的病歷記錄才發現他曾接種疫苗，並即時向醫管局總部和衛生署通報，以及向公眾交代。他承認內部通報機制需加強完善。



專家委員會認為該男子死亡與疫苗接種無直接關係。



疫苗接種計劃將繼續推行。資料圖片



黃先生（81歲）：我同太太會打科興，更啱老人家，我本身有哮喘等氣管問題，專登打電話去明愛醫院問，可以打，我哋相信政府和專家，若疫苗真的不適用，政府肯定會有相關安排。



林女士（67歲）：死者係嚴重糖尿病患者，並有其他長期病患，很可能是本身病症導致，我哋身體健康，相信唔會有事。我想要多啲保護，所以打復必泰。但我老公公有高血壓，為穩陣啲已打科興。

長者點睇



昨日到官涌體育館接種科興疫苗的市民仍踴躍。

專家委員會判斷重點

與打針有無直接關係？

- 據解剖報告，死者一條心血管100%閉塞、兩條心血管70%至90%閉塞，冠心病嚴重，即使無接種疫苗也有死亡風險
- 死者患糖尿病、血壓高，高風險，病情控制不理想
- 若與疫苗有關並出現嚴重敏感，會在注射30分鐘內出現，如吉巴氏症、面癱、橫貫性脊髓炎等情況，但死者打針後無異常

結論：兩者無關

與打針有無間接關係？

- 疫苗會否誘發加速發病？外國資料庫無相關資料

結論：無法證實

是否適合接種宜問醫生

- 高血壓，上下壓長期分別處於160及100
- 糖尿未受控，血糖指標平均值超過10
- 嚴重心臟衰竭、冠心病
- 長期病病情未穩定，如最近覆診時要轉藥或增藥物分量
- 藥物敏感
- 孕婦、哺乳女性

臨床事件評估專家委員會資料來源：新冠疫苗