



接連有市民在接種新冠疫苗後不適或出現異常情況，一名70歲有長期病患老婦昨日入院後離世，她死前9天曾接種科興疫苗，由於她辭世與打針相隔多日，專家相信死因與打針的關係微乎其微；另一名有「暈針」記錄的47歲男子，昨接種科興疫苗後不適送院。為進一步釐清接種疫苗的禁忌，據悉衛生署最快今日發出指引，列明哪類人士暫時不適宜接種科興及復星BioNTech復必泰疫苗。有專家相信，在新指引下或有部分長者不適宜接種新冠疫苗，政府必須調整疫苗接種策略，逐步將40至60歲以及20至40歲人士納入優先接種群組，以加快達致群體免疫的目標。

# 嚴重 糖尿病高血壓 宜緩打疫苗



■優先群組排隊接種。資料圖片

**醫**管局昨向衛生署呈報接種疫苗後異常事件，一名患有高血壓及退化性膝關節炎的70歲老婦，昨早出現氣喘，中午在家中暈倒，送往廣華醫院搶救無效死亡。根據家屬提供的資料，死者曾於上週二(2日)在九龍灣體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗。

另一名67歲患有糖尿病、高血壓及高血脂症的老翁，昨日中午突然在旺角港鐵站暈倒，被送往廣華醫院。初步診斷是急性冠狀動脈綜合症，情況危殆。根據資料，他曾於上週二在私家診所接種科興疫苗。

### 打針9天「出事」 料與疫苗關係微

兩宗個案均在接種疫苗後9天「出事」，專家相信事件與注射疫苗的關係極微。世界衛生組織資料也顯示，疫苗接種異常事件是指免疫接種後發生的，不一定與疫苗

使用有因果關係，但衛生署會在取得所有相關資料(包括第一宗個案的初步解剖報告)後，盡快交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會按世衛的算法流程，評估因果關係。

另外，昨早近10時，一名47歲男子在官涌體育館接種科興疫苗後，於休息區觀察期間感到頭暈，由救護車送往伊利沙伯醫院。接種中心指該名男子沒有長期病患，但曾有「暈針」記錄。

市民對是否適合接種疫苗存有各種疑慮，據了解政府最快今天會公布有關疫苗接種指引的詳情，供醫生及市民參考。指引主要由專家商討後訂定，列出一些不適合接種科興及復必泰疫苗的情況，包括血壓數值，血糖數值，有哪類長期病患等。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅昨透露，指引會列出暫不應接種疫苗的人士，

例如，高血壓且上壓長期超過160、下壓超過100，患糖尿病且血糖平均值長期超過10(見表)。

食物及衛生局副局長徐德義昨表示，目前累計已有約13.05萬名市民接種第一劑疫苗。根據專家意見，現時兩款疫苗均有品質保證，但市民選擇哪一款疫苗，均應仔細閱讀接種須知。

在指引下，相信不少長者或被界定為「宜暫緩接種」類別，以致有接種名額未能用盡，衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆承認，目前本港疫苗接種進度未如理想，有必要調整策略，可擴大接種群組，如為所有與長者同住或照顧他們的人接種；呼吸系統專科醫生梁子超則認為，可考慮擴大優先接種群組，讓更多高危組別如傳媒、或任何有意接種的市民皆可接種。

## 指引添信心 私醫好操作

對於衛生署最快今日公布接種疫苗指引，西醫工會創會會長楊超發指，受早前長者接種疫苗後不適事件影響，目前私家診所約有兩成預約者暫緩接種，以長者居多，相信公布接種指引將增加醫生與接種者信心，「醫生在評估市民是否適宜接種時能有據可循，可更詳細話界市民知(為何適宜)，市民對照指引也會更安心，有助於重建對疫苗的信心，相信呢幾日有不少市民來查詢。」

他認為，指引的操作性不成問題，「醫生會查詢診所及公立醫院的病歷系

統，例如指引中提及的心臟問題，醫生會查番有無記錄，若3條血管中任何一條已堵塞逾50%，即被視為存在隱患，不適宜接種；若無資料，則會通過詢問病人平日是否有胸口痛等症狀。而血壓、血糖等有實際數字指標，就更容易掌握，若接種者不清楚自身狀況，也可即場測試。」

西醫工會流行病委員會主席陳培光亦指，病人在診所接種後不適或死亡，「大眾或會歸咎醫生，對醫生是大大壓力。所以未有指引前，診所醫生對打針好謹慎。」



爆料專線：(852)6066 8769 每人限取一份

### 暫不宜 接種疫苗人士



吸煙並  
懷疑患冠心病




運動時  
出現氣促及胸口痛



高血壓，  
且上壓長期超過160、  
下壓超過100



患糖尿病，且血糖平均值  
長期超過10



有甲狀腺問題



患長期病，  
且正在調校藥物分量

資料來源：新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅



■接種前先看指引更安心。