

# 趕絕臭屁蟲 千祈咪出手

以下貼士，輕鬆趕出家門。  
若發現臭屁蟲出沒家中，請勿直接以手觸碰，留意膚灼熱、潰爛，如被噴到眼睛更有可能導致失明。  
子，成蟲後一旦受驚便會分泌惡臭毒液，造成皮膚或衣物驚現狀似青提的「14粒」蟲  
大埔的居民於網上求助，在窗簾  
日，不少居於新界鄉郊、特別是  
悄入居民居，令街坊聞之色變！近  
時，有「不速之客」趁果樹初熟悄  
春回大地，萬物盛放的同

俗稱臭屁蟲的荔枝椿象專門吸食荔枝與龍眼的嫩枝及汁液，在4、5月龍眼及荔枝樹開花結果時，正是牠們的產卵全盛期，像屯門及大埔等多有種植龍眼及荔枝樹的鄉郊地區更是重災區，蟲卵不時寄生在鄰近民居的窗簾、牆壁甚至是衣物上。

## 產卵14粒 臭液含毒素

荔枝椿象繁殖能力驚人，每隻雌蟲一生平均交配可達10次以上，產卵5到10次，每次產卵約14粒，約兩星期便會孵化成幼蟲。雖然荔枝椿象不會主動攻擊人類，但當受到驚嚇，又或在飛行與掉落時觸碰到人體，身上的臭腺體會分泌惡臭汁液，使人體的接觸部位紅腫、搔癢、灼燒感、潰爛，若噴到眼睛更有可能嚴重致失明。若被荔枝椿象纏附身上，切勿用手直接觸碰，應用鞋子或樹枝輕輕將牠掃走，同時可自製肥皂水，經稀釋後噴灑於蟲身上，約一分鐘內就會窒息死亡。由於其呼吸器官在腹部，所以記得在噴灑時瞄準

蟲的腹部，達到最好效果。

## 自製肥皂水撲殺

至於尚未孵化的蟲卵，一般不會刺激皮膚或造成過敏反應，若發現入侵家居或依附在衣物上，可以牙籤等硬物將蟲卵掃入密封塑膠袋中，蟲卵在沒有空氣之下會自然死亡。又或戴上手套以紙巾包裹蟲卵，再放入馬桶沖掉。由於荔枝椿象每次產卵約14粒，在清除時如發現數目不足，應仔細檢查附近範圍，以防遺漏孵化成蟲。為防荔枝椿象入侵產卵，可在窗戶裝上紗窗，避免將衣物晾曬在植物附近。一旦不慎被荔枝椿象的毒液噴到也別慌張，先用大量清水沖洗患處，避免臭液因為接觸摩擦再擴散，然後塗敷外用藥，通常數日後會自動痊癒。但若出現傷口潰爛、疼痛不退的情況，又或被噴到眼睛，便需盡速就醫。

## 認清臭屁蟲

### 蟲卵

4、5月為產卵盛期，每次14顆，初產時為淡綠色，漸轉黃色，近孵化時呈紫紅色。

### 幼蟲


一歲幼蟲體色為深灰色，兩側有明顯紅色斑塊，體形偏橢圓。2至5歲幼蟲體色為淺橙或橙紅色，背部兩側每節有黃點，呈方塊狀，臭腺位於腹部背面。

### 成蟲

可存活200至300天，幾乎一年四季都會出沒。體色為黃褐色，胸腹部披上白色蠟粉，臭腺位於胸側板靠前方處。

### 衣魚

喜歡棲息於暖和、陰暗及潮濕的環境，並且以醃類、纖維類及蛋白質為主食，紙片及觸角的長形昆蟲，衣魚是有銀色鱗



### 白蟻

堆積紙皮及雜物，保持家居乾爽。吸走，也能使用適量殺蟲劑，避免太嚴重時，可直接以吸塵機至是廚房。在衣魚滋生情況未書中、床底、衣櫃內、罅隙，甚髮也是牠們的食物，經常會現身於皮、書報、漿糊、泥、衣物及毛類、纖維類及蛋白質為主食，紙



### 床蝨

公司向求助。  
家中發現「白蟻窩」，建議向專業滅蟲  
淹死，加入漂白水可增強效果。如在  
放置一盆水，讓飛蟻自行飛入水中  
已經入屋，可在白光的燈下  
包括在雨季關上窗戶，如果  
去，要防止飛蟻入屋，方法  
後，脫翼並築巢繁殖開  
是透過飛蟻飛入屋  
蟻出現的主要原因  
木門框蛀光。白  
驚人，兩星期就可以將  
位置築巢，破壞力極為  
方等長期潮濕及陰暗的  
天花板、地板、浴缸下  
白蟻則喜歡潮濕環境，因此會在  
的啡色糞便，容易分辨。濕木土  
木製品等，牠們會排出芝麻大小  
常滋生於裝修木材、木製傢具或  
白蟻兩類，以乾木為食的白蟻，  
香港最常見有乾木白蟻及土



## 香港春夏常見害蟲

害蟲入侵。  
過敏反應，更會破壞家居環境，故應時刻保持家居乾爽整潔，杜絕  
香港春夏天氣潮濕，特別容易滋生蚊蟲，部分不止令人體造成