



鬥魚種類

國鬥魚可依尾形歸類：低，鬥魚平均壽命為1至2年。其中泰國鬥魚家族中存活，因此飼養難度極高。鬥魚原產地泰國、馬來西亞，是迷



馬尾 (Veiltail Betta)

尾鰭向下拖長類似馬尾，按照尾鰭末端是否集束又可分為桃形尾與紗形尾。



梳尾 (Combo Tail)

此類的鬥魚，尾巴形狀為梳尾形式。馬尾鬥魚跟梳尾鬥魚差別在梳尾鬥魚的臀鰭跟尾鰭的末端為鋸齒狀。



冠尾 (Crowntail Betta)

其特徵在於背鰭，臀鰭跟尾鰭的末端的鰭條有細長的魚骨並且延伸出去。依照冠尾的叉數不同可分為：二叉、四叉、八叉和國王冠尾。



半月 (Half Moon)

尾鰭較長且大，依尾鰭形狀再細分多類，當中又以玫瑰尾 (Rose Tail) 其特徵在於尾鰭的邊緣形成摺疊現象。



鬥魚對環境要求不高。

# 標養鬥魚 愈艷愈靚

不少人鍾意養魚，看着魚兒在水裏游來游去，那種感覺十分治癒。在眾多觀賞魚類中，不少人都選擇養鬥魚，除了因為色彩繽紛及易於飼養外，當牠生氣鼓起泡鰓，魚鰭豎起時極像裙襬，更添美麗，深深吸引不少愛好者的目光。到底鬥魚有多少種類？一般壽命有多久？本文為大家逐一解答。

泰國鬥魚以色彩繽紛見稱。



## 設缸環境

泰國鬥魚對水質要求不高，濾水設備可以省略。加上喜歡用舊水，無須頻換，就算要換水，最好能先曝氣(即加入空氣)兩天。水量則建議每條2至10公升。供給成魚的飼料一天只要吻部大小的1至2倍就足夠，但若是準備繁殖，可提高餵食與換水頻率。

## 溫度設備

泰國鬥魚是熱帶魚種，對高溫有很強的適應力，不過水溫一旦低於23度，活動能力會顯著下降，若是一段時間處於低水溫狀態會致病。因此加溫設備是不可缺少的。

## 繁殖部分

繁殖前，須確保公母魚都開始發情。公魚若發情會開始吐泡巢，母魚若發情會在身上出現縱紋。為避免公魚誤食幼魚或受精卵，應在繁殖前給予公魚足夠的食物。然後將母魚放置在魚缸旁邊(或將母魚放入透明塑膠杯，再將塑膠杯放入公魚所在的魚缸內。如果使用這種方式，因為塑膠杯不大，每天這麼做幾小時就好，不要讓母魚長時間待在小小的塑膠杯裏面)刺激公魚。待公魚吐的泡巢夠大(大約直徑3厘米)且有一定厚度時便可將已發情的母魚放入缸中配對。這時公魚會追逐母魚。等待一天後，觀察泡巢上面有沒有卵，如有便可將母魚撈出。

## 絕不挑食

鬥魚基本上不會挑食，只要能吃的律照單全收，一般餵碎或片狀魚糧，很容易馴服。也可使用活餌，包括紅/赤蟲、蚊子等。

## 謝絕混養

鬥魚的地域性極強，只要是「會動」的生物都會引起其鬥性。這並非針對同類，對其他魚而言也有驚人殺傷力，因此並不適合與其他生物混養。有意見是採用連缸飼養，否則就用珍珠板將原來的缸隔成兩部分，並待有交配特徵時才將珍珠板取走。



鬥魚魚鰭豎起時像裙襬。



鬥魚種類

國鬥魚可依尾形歸類：低，鬥魚平均壽命為1至2年。其中泰的水域環境中存活，因此飼養難度極。鬥魚原產地泰國、馬來西亞，是迷



馬尾 (Veiltail Betta)

尾鰭向下拖長類似馬尾，按照尾鰭末端是否集束又可分為桃形尾與紗形尾。



梳尾 (Combo Tail)

此類的鬥魚，尾巴形狀為梳尾形式。馬尾鬥魚跟梳尾鬥魚差別在梳尾鬥魚的臀鰭跟尾鰭的末端為鋸齒狀。



冠尾 (Crowntail Betta)

其特徵在於背鰭，臀鰭跟尾鰭的末端的鰭條有細長的魚骨並且延伸出去。依照冠尾的叉數不同可分為：二叉、四叉、八叉和國王冠尾。



半月 (Half Moon)

尾鰭較長且大，依尾鰭形狀再細分多類，當中又以玫瑰尾 (Rose Tail) 其特徵在於尾鰭的邊緣形成摺疊現象。



鬥魚對環境要求不高。

泰國鬥魚以色彩繽紛見稱。

# 標養鬥魚 愈艷愈靚

不少人鍾意養魚，看着魚兒在水裏游來游去，那種感覺十分治癒。在眾多觀賞魚類中，不少人都選擇養鬥魚，除了因為色彩繽紛及易於飼養外，當牠生氣鼓起泡鰓，魚鰭豎起時極像裙襬，更添美麗，深深吸引不少愛好者的目光。到底鬥魚有多少種類？一般壽命有多久？本文為大家逐一解答。



## 設缸環境

泰國鬥魚對水質要求不高，濾水設備可以省略。加上喜歡用舊水，無須頻換，就算要換水，最好能先曝氣(即加入空氣)兩天。水量則建議每條2至10公升。供給成魚的飼料一天只要吻部大小的1至2倍就足夠，但若是準備繁殖，可提高餵食與換水頻率。

## 溫度設備

泰國鬥魚是熱帶魚種，對高溫有很強的適應力，不過水溫一旦低於23度，活動能力會顯著下降，若是一段時間處於低水溫狀態會致病。因此加溫設備是不可缺少的。

## 繁殖部分

繁殖前，須確保公母魚都開始發情。公魚若發情會開始吐泡巢，母魚若發情會在身上出現縱紋。為避免公魚誤食幼魚或受精卵，應在繁殖前給予公魚足夠的食物。然後將母魚放置在魚缸旁邊(或將母魚放入透明塑膠杯，再將塑膠杯放入公魚所在的魚缸內。如果使用這種方式，因為塑膠杯不大，每天這麼做幾小時就好，不要讓母魚長時間待在小小的塑膠杯裏面)刺激公魚。待公魚吐的泡巢夠大(大約直徑3厘米)且有一定厚度時便可將已發情的母魚放入缸中配對。這時公魚會追逐母魚。等待一天後，觀察泡巢上面有沒有卵，如有便可將母魚撈出。

## 絕不挑食

鬥魚基本上不會挑食，只要能吃的律照單全收，一般餵碎或片狀魚糧，很容易馴餵。也可使用活餌，包括紅/赤蟲、蚊子等。

## 謝絕混養

鬥魚的地域性極強，只要是「會動」的生物都會引起其鬥性。這並非針對同類，對其他魚而言也有驚人殺傷力，因此並不適合與其他生物混養。有意見是採用連缸飼養，否則就用珍珠板將原來的缸隔成兩部分，並待有交配特徵時才將珍珠板取走。



鬥魚魚鰭豎起時像裙襬。