



嘔吐先兆？

■ 發出乾嘔的聲音；
 ■ 呈現焦躁或緊張的狀態(來回走動、表情不安)；
 ■ 頻率較高的咳嗽或舔嘴；
 ■ 呼吸變得比較急促；
 ■ 微微身體抖動，腹部呈現收縮狀態；
 ■ 口水分泌物比平常更多。

急促，被抱起時還嘔了一些水。香港導盲犬服務中心其後證實，「Lucky」已離世，令人感到悲傷。狗狗嘔吐可大可小，作為狗主必須保持冷靜、小心處理，千萬不能忽視，否則可能錯過了拯救狗狗的黃金時間，到獸醫診所急救。目擊者表示，當時「Lucky」之呼吸非常急促，導盲犬「Lucky」與視障主人到將軍澳某商場期



狗嘔吐後的各種處理方法，給各狗主參考。

機。本報特別整理出狗嘔吐後的各種處理方法，給各狗主參考。

能錯過了拯救狗狗的黃金時間，突然暈倒，多名熱心市民上前將「Lucky」帶到獸醫診所急救。目擊者表示，當時「Lucky」之呼吸非常急促，導盲犬「Lucky」與視障主人到將軍澳某商場期

減少狗狗嘔吐 從日常做起

保持飲食規律

狗和人類一樣都要有規律的飲食習慣，不然會很容易引起狗狗的腸胃不適。有時肚子餓吃得特別多，都會影響胃部正常消化，容易出現嘔吐情況。

減慢進食速度

如吃飯時有另一隻狗在旁，或會令狗狗擔心食物被搶掉，所以快速把東西吃光。狗主可嘗試購買「慢食碗」，其設計可略為減慢狗狗的進食速度。

飯後不做運動

跟人類一樣，如狗狗剛吃飽就馬上做劇烈運動，很容易影響消化。因此若狗狗喜歡散步時亂跑一通，就不應在吃飯後立即帶牠外出，不然會增加嘔吐可能。



嘔也嘔？

膨脹的飼料

如可明顯看到嘔吐物為未完全消化、膨脹的飼料，那表示狗狗是因為吃得太快、太飽，或是因為消化不良而造成的嘔吐。建議可改成小量多餐的方式餵食，不要讓狗狗一下子吃太多。

黃色泡沫狀

若嘔吐物為黃色泡沫狀則可能是胃酸，多半是因為過於飢餓，或有腸胃炎問題，建議可調整餵食時間，同時小量多餐，避免狗狗因過度飢餓引發嘔吐胃酸。

白色泡沫狀

白色泡沫狀可能為腸胃、肝腎、中毒、代謝性疾病或是傳染病等問題。建議要觀察、記錄狗狗嘔吐後的狀況，並同時留意狗狗其他症狀，有利於獸醫尋找可能原因。

帶紅色或深褐色泡沫

若狗狗吐出紅色、深褐色泡沫，或是伴隨血絲的液狀物，通常表示消化道有出血問題。輕則可能是腸胃炎問題；重則可能是胃出血或十二指腸潰瘍，建議馬上就醫。

細長條的蟲體

若嘔吐物中有長條狀疑似蟲體的東西，則可能為蛔蟲等寄生蟲感染問題。建議可拍下嘔吐物的照片，以便獸醫判斷，且盡早求醫。

狗狗嘔吐 可大可小

嘔吐處理 3步驟

- 回想狗狗什麼時候、情況下嘔吐？若需送院，有助獸醫判斷狗狗嘔吐的原因。若發現狗狗是亂吃東西才嘔吐，建議馬上就醫。
- 記錄嘔吐物的顏色及外觀，能拍照留存更好。就診時直接將照片給獸醫看，提供更多診斷證據。
- 觀察狗狗嘔吐後的狀態，若精神奕奕、會吃會喝會玩，同時沒任何異狀，那就可在家觀察，暫不需送院；若狗狗沒有食慾、連續性嘔吐、或嘔吐物有異物、異味、血絲，甚至伴隨腹瀉、發燒等症狀，建議盡快就醫，尋求專業獸醫協助。

