



■戶外有蛇出沒，市民報警由蛇王捉走。 資料圖片

本港常見毒蛇種類

漁護署官網資料顯示，本港8種可咬噬致命的毒蛇如下：

- 紅脖游蛇
- 過山烏
- 金腳帶
- 越南烙鐵頭
- 銀腳帶
- 原矛頭蝮
- 眼鏡蛇
- 珊瑚蛇

蛇咬逾九成來自青竹蛇

本港被毒蛇咬傷九成以上是被青竹蛇所咬，毒性較輕，並無性命危險。導致傷者死亡的個案，絕大部分是由於延遲治理或提供錯誤資料、或缺乏適當抗毒血清所致。現時全港公立醫院急症室已儲備適當血清及有詳細指引，只要傷者有適當院前處理，及早求診及向醫生提供正確資料，傷者是可以治癒的。

另外，如不慎被毒蛇咬傷，傷者可能不會出現任何症狀，因為毒蛇不一定會釋放毒液，或只放出少量毒液，約有兩成個案屬此類別，稱為乾咬。只有小部分人因有毒液注入人體而出現比較嚴重的症狀，本港並沒有確實個案因毒性蛇傷而引致即時死亡。



■咬傷市民最多的原來是青竹蛇。 資料圖片

常見的有什麼毒蛇？以下一一為大家講解，以備不時之需。長、黑白間條的蛇。市民若不幸被蛇咬，應該怎樣處理？至於本港昨日警方接獲港鐵職員報案，指有乘客在車廂內發現一條約40厘米，繼早前沙田新城市廣場 Movie Town 戲院有職員發現有蛇出沒後，

被蛇咬傷 應該點做？

6大不要做的事

1. **不要打蛇：**
可能讓蛇攻擊第二次。
2. **不要吸吮、切開傷口：**
可能增加感染機率，或加速毒液吸收。
3. **不要塗抹精油、草藥：**
無法有效止痛，還可能讓組織更容易壞死。
4. **不要火烤、冰傷口：**
恐導致血管收縮，讓組織更容易壞死。
5. **不要喝酒：**
會促進血液循環，加速蛇毒擴張。
6. **不要跑步：**
會促進血液循環，加速蛇毒擴張。

如何處理？

1. **拍照、錄影：**
紀錄蛇的外觀，幫助醫師判定蛇的種類。
2. **解開束縛物：**
毒蛇咬傷約有96%在四肢部位，應脫下戒指、手鐲等物，以免中毒使組織腫脹，不僅不好取下，還會令局部壓迫更嚴重。
3. **清洗：**
若咬傷部位沾到泥土、垃圾等髒污，可清洗傷口。
4. **細綁靠近心臟的一端：**
可透過襪子等身上物品在靠近心臟處稍作細綁，阻止血液、淋巴回流。
5. **保持鎮定、不要驚慌、不要隨意移動：**
避免毒液流往心臟速度加快，盡快報警。

不同毒蛇 症狀不同

1. 出血性毒蛇：如龜殼花、百步蛇、青竹絲

一般於30分鐘至1小時內，產生局部腫脹、瘀血、疼痛、淋巴結腫大。若未經治療，則腫脹會由咬傷處迅速擴展，並恐導致水泡、肌肉壞死、血壓下降、昏迷或休克全身性症狀。由於有時會在咬傷後12小時才出現症狀，建議可在醫院多觀察久一點。

2. 神經性毒蛇：如眼鏡蛇、雨傘節

此類神經性毒素會作用於運動神經與肌肉接合處，症狀多為複視、眼瞼下垂，接着在數十分鐘至1、2小時內，造成吞嚥困難、肌肉無力痙縮、瞳孔擴大、呼吸衰竭等嚴重症狀。傷口較少疼痛、瘀血，即便腫脹也不會像出血性毒素一般擴散。若症狀輕微（局部麻痛），也未在6至8小時惡化，研究顯示出院門診追蹤即可。

3. 混和性毒蛇：如鎖鏈蛇、海蛇等

會造成上述出血性、神經性毒蛇咬傷臨床症狀，包括凝血、溶血毒、神經毒、心臟毒、肌肉毒等。由於綜合兩種毒素特性，也建議在醫院多觀察一段時間。

6招預防

1. 不要抓蛇、逗蛇。
2. 在毒蛇出沒地區，最好穿皮靴、厚長褲。
3. 不要空手伸入中空樹叢、濃密雜草堆、翻動石塊、跨過石塊、木頭等物。
4. 露營時應選擇空曠、乾燥的地區，避免紮營於雜物堆附近。晚上應在營帳周圍升起營火、火炬。
5. 在毒蛇常出沒地區，不要涉水、游泳，以防被水中毒蛇咬傷。
6. 經過草堆、石縫、枯木、竹林、陰濕處、溪邊等蛇類喜歡棲息處應特別留意。

