

衛署巡查揪出黑店

喉糖冒碘片 圖發災難財

日本一場世紀地震，令距災區千里的香港亦深受影響，繼日前的搶奶粉和搶鹽潮後，食物及衛生局發現，香港有藥房以含碘成分的喉糖更改標籤後，當成碘片出售圖發「災難財」。食衛局副局長梁卓偉指出，碘片為管制藥物，現時坊間根本不可能購買得到。另外，他表示，香港糧食充足，其中昨日共有九千一百九十三箱、逾七萬罐日本奶粉抵港應市，呼籲市民毋須急於搶貨推高零售價，以免自亂陣腳引起恐慌。

本報記者 陳耀麟 李家祺

►梁卓偉指出，坊間無可能有碘片出售
本報攝



受日本核輻射危機影響，近日部分食品價格急升，更有不法分子在市面售賣假碘片斂財。衛生署在過去兩日的行動中，署方派員巡查七十四間藥房和三十四間藥行，在一間位於上環、名為寶盈藥業有限公司的藥行中搜獲三十樽名為「含碘喉症片」的含碘喉片。梁卓偉表示，該店舖將產品的原有標籤除去，換上附有受輻射影響時使用的一百三十毫克碘片服用方法的新標籤，誇大碘含量，再向市民發售。

當局調查後或提出檢控

現時衛生署因應事件進行詳細調查，當局並可能提出檢控。署方表示，該藥物「含碘喉症片」是註冊藥劑製品，每片含有一點五毫克碘，用於舒緩喉嚨不適，對人體並無害。梁卓偉指出，坊間無可能有碘片發售。「由於碘片屬於藥劑製品，須向藥劑業及毒藥管理局註冊，而至今除了衛生署本身註冊一款產品外，並無其他註冊紀錄。」

他說，現時香港並不需要服食碘片，而且服食過量更會對人體產生不良效果。


另外，本港前日掀起「搶鹽潮」，有零售商更將食鹽加價十倍圖利；經食衛局局長周一嶽指出食鹽無助對抗輻射後，搶鹽潮暫告一段落。但有部分貨品如日本奶粉等仍然十分渴市，同時亦有市民擔心日本進口食物欠安全，因此趁機提早入貨避免日後購買受輻射感染的貨品。

逾七萬罐日奶粉昨進口

為釋除公眾疑慮，梁卓偉昨日表示，自核事故發生後，當局一直為日本入口食品進行監測，由上周六下午至昨午二時，當局已為一百五十一批次入口食品進行抽樣檢測，全部均符合標準；昨日有奶粉進口應市，「到港奶粉有九千一百九十三箱，以每箱六至八罐為例，約有七萬多罐奶粉抵港，當中有不同牌子、適合不同年齡的嬰孩奶粉，相信可應付需求。」不過，梁卓偉也表示，日本當地糧食不足，希望市民有心理準備，日後日本輸港食品可能會減少，例如家長可以逐步為嬰兒轉用其他奶粉。他呼籲市民要理性應對，不要自亂陣腳；而政府工貿署有足夠儲備供應，市民不需囤積食物。



▲涉嫌售賣假碘片的藥房，未有回答記者提問便提早關門
本報攝



▲衛生署檢獲聲稱是「碘片」的產品



◀隨著七萬多罐日本奶粉昨日抵港，應可舒緩市面的日本奶粉荒
資料圖片

醫生：港現集體恐慌行爲

籲市民要邏輯思考謠言可信性



▲本港前日因輻射恐慌而出現市民盲目搶購食鹽情況，有精神科醫生指屬於集體性恐慌行爲

立會今討論日核危機 官員將詳釋事態發展

【本報訊】立法會保安事務委員會今天（周六）討論日本福島核危機，政務司司長唐英年希望會議延長，讓官員有足夠時間解釋事態發展和當局的緊急應變措施。

有議員昨日建議立法會就日本福島核電站事故對香港的影響，邀請所有相關官員出席討論。立法會保安事務委員會稱，特區政府極度重視事態的發展，唐英年昨日向委員會表示希望延長會議，讓官員有足夠時間解釋事態發展。立法會保安事務委員會將把此項議程討論時間延長四十五分鐘，達至一小時四十五分鐘，如有需要，委員會將繼續延長會議時間，或由內務委員會舉行特別會議，以確保官員有足夠時間向公眾解釋事態發展及當局的緊急應變措施。

【本報訊】本港近日出現「盲搶潮」，無論日本奶粉、食鹽等都被市民搶購一空。精神科醫生認為，這現象反映市民擔憂核電危機，屬集體性恐慌行爲，呼籲市民不應自亂陣腳，應有邏輯性思考謠言的真確性。

搶購潮反映核危機擔憂

近日市面出現瘋狂搶購潮。香港醫學專科學院精神科代表麥永接表示，這現象反映市民擔憂核危機的反應，屬集體恐慌行爲。他認為，本港並未受到日本的核輻射影響，惟近日不斷有謠言稱輻射污染海水導致鹽貨短缺，謠言不斷擴大，造成恐慌的現象。他說：「這類流言聽落好似有理由，被不斷放大，以訛傳訛，將二手訊息不斷扭曲，導致集體恐慌的現象。」

他呼籲市民不要自亂陣腳，要有理性分析，用邏輯思考謠言的可信性；而政府亦應派專家分析謠言，避免造成公眾恐慌。

麥永接又提到，曾經歷、目擊或面對牽涉死亡或嚴重受傷事故後，均有可能出現創傷後壓力症，容易感到焦慮、抑鬱、失去安全感等其他精神困擾的問題，其中於當地工作或旅行的市民（包括機組人員）、災民親屬，以及曾經歷創傷或有潛在情緒問題的人，均屬高危一族。但並非所有曾接觸災難的人均會患上創傷後壓力症，若短期內出現精神困擾的反應屬正常，大多於一個月逐漸消失，惟問題持續一個月或以上，則有可能患上創傷後壓力症，可向精神科醫生接受診治。

囑港孕婦勿過慮

【本報訊】近日除了出現「盲搶潮」外，坊間亦有人擔心輻射影響胎兒。有婦科醫生說，微量只有五十毫希以下的輻射量，並不會對胎兒有影響；若輻射達五十至五百毫希或以上，則有可能對胎兒構成影響，特別是二至七周和八至十五周的懷孕期，可能會出現器官畸形或影響智商。香港醫學專科學院婦產科發言人

余啓文表示，醫學界並未發現少於五十毫希輻射對胎兒有任何健康的影響；若輻射量達至五十毫希以上，則可能會對胎兒構成影響，特別是二至七周及八至十五周的懷孕期。他解釋，二至七周及八至十五周的懷孕期，是胎兒器官處於「正發展」和「剛完成發展」階段，若曝露於高劑量的輻射則會導致器官畸形，身體殘障，甚至破壞中樞神經，令智商下降。

余啓文說，若輻射量每高一千毫希，胎兒平均智商將會下降約二十五至三十一點，胎兒日後患上癌病的風險將會高十二個百分點，十八歲成年後亦會較常人矮三至四個百分點。而成年人若感染高劑量的輻射，可令精子及卵子數量減少，但不會影響受精的質素。他表示，即使沒有任何輻射的影響，亦會出現小產及生畸胎的風險，呼籲孕婦毋須過於擔心。



▲香港醫學專科學院一眾醫生就着日本核輻射恐慌衍生的情況及疑慮進行講解
本報攝



▲港府已在機場設立「日本抵港旅客衛生台」，並為旅客檢查體外的輻射水平

倡曾留福島港人 可入院詳細檢查

【本報訊】對於部分市民擔心日本的核輻射會影響本港，有放射性科醫生表示，輻射傳染他人的機會較微，而人體曝露於一千毫希或以上的輻射量才有感染輻射的徵狀，惟機場只為旅客檢查體外的輻射水平，建議曾在輻射重災區福島逗留的市民，可到醫院進行詳細的體內檢查。

香港放射科醫學院院長羅振基表示，市民日常生活每年吸收二至三毫希的輻射量；平常接受任何放射性診斷，亦會吸收零點一至十五毫希不等的輻射量（詳見表）；而職業放射性治療師，每年更會吸收二十毫希的輻射量。

羅振基表示，輻射有別於傳染病，吸入體內的輻射較少機會影響他人，一百毫希或以上的輻射會對人體有長期影響，卻可以並無任何病徵；但吸收超過一千毫希以上的輻射，數小時便會出現感染徵狀，包括作悶、嘔吐、腹瀉等；吸收過量輻射，體內的淋巴細胞會於四十八小時急跌，令骨髓不能製造血液。他指出，輻射對人體的影響，視乎輻射的強度，以及

曝露輻射時間的長短。由日本回港的市民若出現嚴重徵狀，大多可於返港的航機上被發現。因此他呼籲市民毋須太過擔憂，若市民有需要進行詳細的檢查，特別是曾逗留於輻射重災區福島的市民，可到醫院作詳細檢查。

香港醫學專科學院急診科醫學院代表蔡宇暉補充，醫院近日為返港的市民進行輻射測試，均未出現有陽性結果。他說，美國歷史上因輻射而死的個案近乎零。因此他認為是次事件是恐慌大於實在。他表示，日本現時的輻射水平並非太高，相信情況應該不太嚴重，但事件仍存有變數，應視乎情況，才判定是否需要強制要求返港旅客接受輻射測試。

各類放射性診斷的輻射量

放射性診斷	輻射量
胸肺X光	0.1毫希
乳房造影	0.3-0.6毫希
銀劑灌腸造影	3-6毫希
胸部電腦掃描	5-7毫希
腹腔及盆腔電腦掃描	8毫希
正電子及電腦掃描	15毫希

資源來源：香港醫學專科學院