

衛生署：病毒傳播較登革熱快四倍

港科企研基孔熱快測劑 料數周後面世

本港今年暫時錄得五宗基孔肯雅熱輸入個案及一宗可能個案，衛生署署長林文健昨日表示，香港出現的基孔肯雅熱病毒屬「中非型」，特點是基因突變多，傳播速度快，預期輸入個案風險將持續增加，不排除出現局部本地傳播。衛生署嚴陣以待，公立醫院正在引入測試，提升核酸檢測量；署方並已聯絡私營檢測業界，嚴峻時期幫忙應付檢測需要。

全球現時未有準確的基孔肯雅熱快速檢測，有本港生物科技公司負責人昨日接受《大公報》專訪時透露，研發快速測試劑試驗已進入最後階段，預期最快數星期後面世，可以供應診所及醫院，透過「篤手指」驗血，最快10分鐘有檢測結果，能幫助及早找出疑似患者。

大公報記者 賴振雄

根據世界衛生組織資料顯示，基孔肯雅熱已在全球超過119個國家出現本土傳播，今年已有16個國家或地區出現本地傳播，影響逾24萬人，當中包括港人熱門旅遊景點。本港今年截至昨日下午5時，累計錄得五宗輸入個案，另有一宗可能個案。

公院引入核酸測試 提高效率

衛生署署長林文健表示，基孔肯雅熱感染個案，以東、中、西非型的病毒基因為主，香港屬於「中非型」，基因突變較多，傳播速度較登革熱快四倍。全球變暖導致蚊媒由熱帶或亞熱帶地方向溫帶擴展，加上旅遊頻繁，若周邊地區持續出現感染個案，香港的輸入個案將會持續增加，若然防蚊措施做不好，不排除造成局部本地傳播。



▲林文健表示，預期基孔肯雅熱輸入個案風險將持續增加，不排除出現局部本地傳播。

現時本港在各個口岸有向旅客進行體溫篩查，林文健指出，基孔肯雅熱潛伏期長達12天，患者若過關時仍處於潛伏期，可能沒有發燒，抵港後才病發，所以單靠在口岸把關並不足夠，須向旅客作出更多宣傳教育，呼籲旅客入境後繼續留意身體狀況。

基孔肯雅熱主要透過蚊叮傳播，現時透過核酸測試確認患者是否確診。核酸檢測方法是先抽血、將樣本送往化驗所，一般四小時有檢測結果，並在一日內通知。林文健表示，衛生署轄下的公共衛生化驗所已提升檢測能力，每天可處理數以百計的樣本；衛生署亦與醫院管理局合作，提升試劑儲存量，目前有足夠儲備，以及在公立醫院引入測試，令檢測更快。衛生署並計劃聯絡不同的服務提供者，以備一旦個案大量增加，出現嚴峻時期，可以隨時準備幫忙。

「篤手指」取血 10分鐘有結果

全球現時未有準確的基孔肯雅熱快速檢測。本港的生物科技公司「相達生物科技」董事長及首席執行官招彥燾接受《大公報》專訪時透露，正在研發基孔肯雅熱快速測試劑，大致完成抗體及抗原測試，形容距離研發成功已經進入最後階段，預期快測試劑最快數個星期內面世。

招彥燾指出，核酸測試與快測的分別，核酸測試的優點是更加準確，但需要抽取五毫升血液量，不可以「篤手指」驗血，運輸及等候化驗結果要四小時，若面對大量懷疑個案，未能夠最快得出結果；快測則可以透過「篤手指」驗血，簡單又方便，約10分鐘有結果，方便醫院及診所應用，迅速處理大量懷疑個案，及早找出患者。

全球首宗的基孔肯雅熱病例，早於1952年在非洲坦桑尼亞被發現，早期主要在非洲零星爆發，直至2005年後病毒出現突變，傳播效率提高，導致疫情在全球大規模擴散，目前沒有特定的抗病毒藥物，治療方法主要是舒緩症狀，包括使用退燒藥、止痛藥和補充體液。



▲自從本港出現基孔肯雅熱輸入病例後，不少地區及屋苑都加強滅蚊工作。



▲食環署「滅蚊新科技孖寶」，大型遙控滅蚊機及新型捕蚊器「蚊子陷阱」。



為加強預防基孔肯雅熱等蚊媒疾病，食環署近期引入「滅蚊新科技孖寶」，大型遙控滅蚊機可以盛載70公升滅蚊藥水，噴灑距離又遠又廣，工人也不用再辛苦背着重重的噴灑器；另一裝置新型捕蚊器「蚊子陷阱」，除了殺滅蚊子陷阱內的蚊幼蟲外，雌蚊同時沾上特製藥粉後，飛到附近積水地點產卵，亦可將蚊蟲幼蟲羽化，雌蚊也會於幾日內喪命。

食環署表示，因應近期的基孔肯雅熱輸入個案，過去一星期已派員到確診患者居住的觀塘、港島南區及葵青區，以及病人曾到訪地點的250米半徑範圍，展開病媒調查和加強滅蚊工作，防止基孔肯雅熱在本港傳播。

網上公布誘蚊器指數

為讓市民更快掌握蚊患風險，食環署已定期在官網公布誘蚊器指數，增加發放最新數據，提升透明度，又會將原先在分區指數達20%（即第三級）時進行的強化控蚊工作，擴展至指數介乎10%至20%（即第二級）的分區，進行詳細風險評估，找出高風險地點，聯同部門同持份者展開密集式、針對性滅蚊行動，同時亦會通知相關屋苑，提醒物管公司和住戶提高警覺，一同做好防蚊工作。

根據食環署公布，8月份第一批白紋伊蚊誘蚊器指數，涵蓋13個監察區，當中12個監察區的指數也低於10%，屯門區掃管笏的指數最高達到16.4%。該署已聯同有關部門及持份者，強化滅蚊工作，找出蚊患情況較高的地點，進行密集且具針對性的控蚊。 大公報記者 賴振雄

18至49歲長期病患者 將獲資助打流感針

逐步擴展

衛生防護中心每年均會推出流感疫苗資助計劃，資助一些較易「中招」的高危人士接種流感疫苗，包括六個月大至未滿18歲的兒童及青少年、50歲或以上人士、孕婦、醫護人員等。衛生署署長林文健昨日表示，上季度接種疫苗的覆蓋率達到新高，院舍接種率達八、九成或以上，今年是適當時機擴展計劃，覆蓋所有18歲至49歲長期病患者。

現時全港有超過1600名醫生登記參與

流感疫苗資助計劃，政府會提供每劑260元的資助，當中超過一半參與資助計劃的醫生不會額外收費。不符合資格的市民可以選擇自費接種流感疫苗，視乎地區、診所、疫苗種類，注射式流感疫苗價格介乎300元至500元，噴鼻式流感疫苗則500元左右，部分診所或會收取額外醫生診症費。

料受眾增加約30萬人

早前有消息傳出，政府有意擴大流感疫苗資助計劃受助範圍，18至49歲患有指

定類別長期病患的人士將可獲資助，涵蓋糖尿病等指定慢性病，最快在2025至26年度的資助計劃開始實行。

衛生署署長林文健昨日表示，上季疫苗計劃接種率較理想、覆蓋率達新高，認為在有關階段性突破下，是時候擴展計劃，涵蓋更多重點人群，預料資助計劃受眾增加約30萬人。他指出，科學數據顯示，對比無接種疫苗者，接種疫苗有效減少18歲至49歲長期病患兩倍以上的住院率、一倍以上的死亡率。 大公報記者 賴振雄

網絡成癮影響成長 專家籲身教最重要

【大公報訊】記者陳杰報道：疫情期間，不少學生需要在家上網課，接觸電腦及手機的時間越來越多，年紀也越來越小，隨着接觸越多，或易引致網絡成癮。政府精神健康委員會委員葉柏強認為，網絡成癮會影響學童成長，建議家長應該以身作則，以及陪伴子女使用互聯網，減低網絡成癮風險。

出現過度活躍及專注力不足

葉柏強昨日出席一個電台節目時指出：「香港的父母，特別是有年幼子女的，自己本身都沉迷電子產品，沉醉在使用高科技產品中，越用得多，小朋友之後有精神健康、行為問題、發生過度活躍等風險大幅增加，原因包括缺乏同小朋友進行互動，沒有一起做運動，甚至會影響小朋友的睡眠，家長在小朋友自小開始陪伴他們，使用互聯網，減低他們早期亂用網上平台網絡成癮的風險，對他們成長的健康幫助非常大。」

葉柏強又提到，過往幾年市民面對不同壓力，小朋友及青年面對的精神健康壓力及學習挑戰更加嚴峻，認為近年學童受

疫情及家庭功能變化影響，小朋友未能得到家庭、長輩及老師支援，出現過度活躍及專注力不足等問題，建議學校要與社區及專業人士合作，鼓勵小朋友多做正向社交活動、多做運動、並養成良好睡眠習慣，亦要減少使用電子產品等。

輕生者手機用量高同儕七成

出席同一場合的香港精神健康議會召集人陳仲謀指出，有研究顯示成功自殺的少女，她們用手機的頻率比不會自殺的同儕多出七成，情況令人擔心；他又表示，現代人使用手機上網，手機很有用，提供很多資料，但手機上網就如「水能載舟、亦能覆舟」，如果沉迷使用手機（上網）、依賴了就問題大。」

另外，他期望政府建立統籌系統，減少本港精神健康服務資源分散。「澳洲有一個精神健康公署，每個州都有公署，還有國立的公署，統籌這些（精神健康）活動、這些服務、資源分配都是他們決定。希望特區政府可考慮成立類似的心理健康管理局、公署，對統籌有好重要作用。」



▲▲葉柏強認為，網絡成癮會影響學童成長，家長應該以身作則，陪伴子女使用互聯網，減低網絡成癮風險。



網絡成癮可致抑鬱失眠

話你知道

根據東華三院相關網站顯示，網絡成癮被外國心理學學者界定為與病態賭博相似的控制衝動行為。所謂上網成癮是由於過度使用互聯網，使用者本身的社會功能如工作、學習和生活等方面受到嚴重的影響和損害。

從心理角度上講，網絡使用者對網絡產生依賴性和耐受性，也就是所謂的上網成癮，患者只有通過長時間的上網才能激起興奮來滿足某種慾望，當他們試圖減少使用網絡時間，有可能出現吊癮症狀譬如坐立不安、憂鬱、消沉或暴躁等感覺。同時成癮者通常花大量時間於網絡中，因此可能忽略了身邊在生活中對他重要的人，如家人、伴侶及朋友等。

從生理角度來看，沉溺上網行為對人體的健康影響甚大，尤其會使人體的植物神經功能嚴重紊亂，導致失眠、緊張性頭痛、背部疼痛、眼睛疲勞等；同時還可能使人情緒急躁、抑鬱和食慾不振。長時間的上網還使人不願與外界交往，行為孤僻，喪失了正常的人際關係等。